

Preferencias anticonceptivas en mujeres sexualmente activas que no utilizan métodos anticonceptivos en Perú

Contraceptive preferences in sexually active women who do not use contraceptive methods in Peru

Melissa Gutiérrez Chuchon ¹, Oscar Munares-García ²

1. Estudiante de cuarto año de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
2. Licenciado en Obstetricia, Doctor en Ciencias de la Salud, Magíster en Salud Pública, Departamento Académico de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Introducción:

Los métodos anticonceptivos y la atención institucional del embarazo y parto son herramientas de la salud reproductiva, se cuenta con parejas que aún no cuentan con método anticonceptivo.

Objetivo:

Estimar las brechas de utilización y preferencias de métodos anticonceptivos en mujeres en edad fértil de Perú.

Material y métodos:

Estudio retrospectivo, transversal, en 1588 mujeres en edad fértil entrevistadas en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) correspondiente al año 2018. Se determinó mujer a la mujer sexualmente activa, que haya tenido actividad sexual en las últimas cuatro semanas y manifiesta no tener método anticonceptivo. Se aplicó estadísticas descriptivas no ponderadas.

Resultados:

El 40,6% de las mujeres que tenían actividad sexual y no empleaban método anticonceptivo, señalaron que preferían el inyectable, 21,4% el implante subdérmico, el 12,7% el píldoras, 7,6% preservativos, 10,5% esterilización, 3,9% dispositivo intrauterino y 3,4% otro método. La preferencia por método inyectable se reduce conforme se incrementa el rango de edad, 53,2% entre 12 a 19 años y 37,3% entre 35 a 49 años. Así mismo es mayor en el ámbito rural (48,5%) que en el urbano (36,9%), conforme se incrementa los quintiles de riqueza es menor la preferencia por este método (47,3% para el quintil muy pobre, y 23,5% para el quintil muy rico), las regiones con mayor preferencia fueron Loreto (51,5%), Pasco (50,0%) y Piura (49,3%).

Conclusiones:

Las mujeres en edad fértil que tienen actividad sexual y no emplean método anticonceptivo, prefieren métodos inyectables e implantes subdérmicos en mayor medida.

Palabras clave: Método anticonceptivo, Perú, Mujer en edad fértil



Resumen revisado y seleccionado para el I Congreso Internacional de Obstetricia