

Resultados adversos maternos y perinatales del embarazo en adolescentes menores de 15 años. Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2000-2017

Adverse maternal and perinatal pregnancy outcomes in adolescents under 15 years. Hipólito Unanue Hospital from Tacna, 2000-2017

Diana Huanco-Apaza ¹, Manuel Ticona-Rendón ², Diana Ticona-Huanco ³

1. Obstetra asistencial. Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Doctora en Salud Pública. Docente investigadora, Universidad Latinoamericana CIMA. Tacna, Perú.
2. Médico pediatra y neonatólogo. Doctor en Salud Pública. Docente investigador, Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Tacna, Perú.
3. Estudiante de medicina. Universidad Privada de Tacna. Tacna, Perú.

Introducción:

La adolescencia temprana es la etapa más vulnerable física, psicológica y socialmente; la maternidad en esta etapa representa un problema de salud pública y de derechos humanos, es un indicador de desarrollo y síntoma de múltiples problemas sociales.

Objetivo:

Determinar los resultados adversos maternos y perinatales del embarazo en adolescentes menores de 15 años en Tacna.

Material y métodos:

Estudio de cohorte retrospectiva en todas las madres adolescentes menores de 15 años comparadas con todas las madres adultas de 20 a 24 años cuyos partos fueron atendidos en el hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el período 2000-2017. Se comparó características maternas utilizando frecuencias y Chi2 con significancia estadística cuando $p < 0,05$, los resultados se midieron utilizando Riesgo Relativo (RR) con Intervalo de Confianza (IC) al 95% considerando riesgo significativo cuando $IC > 1$ y $p < 0,05$. Los datos se obtuvieron de la base de datos del Sistema Informático Perinatal (SIP2000) y se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 26.

Resultados:

De 60 413 partos, 312 correspondieron a adolescentes menores de 15 años representando 0,52%, habiendo reducido de 0,74% a 0,35% en este periodo. De ellas 71,8% tuvieron 14 años y 22,8% 13 años. Las adolescentes tempranas presentaron significativamente menor grado de instrucción, soltería y dependencia económica que las adultas ($p < 0,05$). Los resultados maternos fueron: control prenatal ausente (RR=1,40), o inadecuado (RR=2,47), inicio tardío del control prenatal (RR=2,65) y terminación por cesárea (RR=1,72), no presentó mayor riesgo de morbilidad ni mortalidad materna. Los resultados perinatales fueron: bajo peso al nacer (RR=1,58), prematuridad (RR=1,75), pequeño para la edad gestacional (RR=2,06), síndrome de dificultad respiratoria (RR=2,10) y mortalidad neonatal (RR=2,24).

Conclusiones:

Las adolescentes menores de 15 años en el hospital Hipólito Unanue de Tacna no tuvieron control prenatal o fue inadecuado y tardío, su recién nacido presentó mayor riesgo de morbimortalidad que las adultas.

Palabras clave: Embarazo en adolescencia, Morbilidad neonatal, Mortalidad neonatal, Mortalidad materna, Adolescencia temprana.



Resumen revisado y seleccionado para el I Congreso Internacional de Obstetricia