

Factores de riesgo asociados a lesiones precancerosas del cuello uterino en pacientes atendidas Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 2014-2015

Risk factors associated with precancerous lesions of the cervix in patients treated Hospital Víctor Ramos Guardia Huaraz 2014-2015

Maximiliana Quispe Gómez ¹, Consuelo Teresa Valencia Vera ², Ladmila Ruiz Guio ³, Patricia Fiorella Salazar Quispe ⁴

1. Obstetra, Doctora en Planificación y Gestión. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Ancash, Perú.
2. Obstetra, Doctora en Salud Pública. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Ancash, Perú.
3. Médico patólogo, Doctora en Salud Pública. Hospital Víctor Ramos Guardia. Ancash, Perú.
4. Estudiante de Medicina. Universidad de Aquino. Bolivia.

Introducción:

La presente ponencia, Permitirá difundir los factores de riesgo de las lesiones precancerosas, hallados en la zona sierra y compararlos con los resultados de otras regiones, para sensibilizar a los asistentes al desarrollo de actividades preventivo-promocionales y así contribuir a disminuir la probabilidad de desarrollar lesiones precancerosas de cuello uterino.

Objetivo:

Determinar los factores de riesgo asociados con lesiones precancerosas del cuello uterino en pacientes atendidas en el Hospital Víctor Ramos Guardia 2014-2015.

Material y métodos:

Estudio Observacional de casos y controles, realizado en el Hospital Víctor Ramos Huaraz - Ancash, muestra conformada por 183 mujeres, con y sin lesiones cervicales, La información fue recolectada a través de una ficha de recolección de datos, lo cual abarco las variables de estudio, los datos recolectados que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión fueron procesados mediante el ordenamiento y tabulación de datos, presentación de tablas, se usó el programa estadístico SPSS V20, para el análisis se empleó la distribución de tablas y gráficos, así como las pruebas estadísticas el χ^2 y el OR.

Resultados:

Se halló como factores asociados al riesgo: procedencia rural ($X^2 = 28,109$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=3,92$, $IC95\%:2,32-6,61$), antecedentes familiares: $X^2=15,753$, $P\text{-valor}=0,001$, $OR=3,13$ con $IC95\%:1,66-5,91$); inicio de las relaciones coitales entre 14 -16 años ($X^2=157,669$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=29,51$, $IC95\%:7,04-123,76$); Con 2 o más compañeros sexuales ($X^2=127,315$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=16,06$, $IC95\%:9,48-27,21$); Infecciones de Transmisión Sexual en los últimos 5 años ($X^2=55,585$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=5,44$, $IC95\%:3,43-8,62$); tipos de ITS: el Papiloma Virus Humano ($X^2=9,108$, $P\text{-valor}=0,058$, $OR=2,54$); Multigestación ($X^2=152,653$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=20,83$, $IC95\%:12,20-35,55$); Multiparidad ($X^2=138,245$, $P\text{-valor}=0,000$, $OR=17,21$, $IC95\%:10,15-29,17$); uso de anticonceptivo hormonales ($X^2=1,979$, $P\text{-valor}=0,001$ a una confianza de 95%, tipo inyectable es de mayor uso (52,7%) y el tiempo de uso más frecuente fue 1 y 2 años con un (41,8%) ($X^2=12,357$, $P\text{-valor}=0,006$).

Conclusiones:

Los factores asociados con lesiones precancerosas del cuello uterino: la Procedencia rural, antecedentes familiares, de inicio de las relaciones coitales entre 14-16 años, contacto sexual con 2 o más compañeros sexuales, presencia de ITS. en los últimos 5 años y el (PVH), la Multigestación, multiparidad y el uso de anticonceptivo hormonal de tipo inyectable.

Palabras clave: Factores de riesgo, Lesiones, Cáncer de cuello uterino



Resumen revisado y seleccionado para el I Congreso Internacional de Obstetricia