

LA ADOLESCENCIA COMO FACTOR DE RIESGO PARA COMPLICACIONES MATERNO FETALES EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA 2018

ADOLESCENCE AS A RISK FACTOR FOR MATERNAL FETAL COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN CARED FOR AT THE VENTANILLA HOSPITAL 2018

Luisa Magali Rivas Alvarado ^{a,b,c}

- a. Licenciada en Obstetricia
- b. Magister en Salud Pública
- c. Especialista en Monitoreo Fetal



Introducción

Mundialmente, 23% de complicaciones del embarazo suceden en adolescentes, mayor prevalencia en restricción del crecimiento intrauterino y muerte neonatal. En Perú, Endes 2019, 12.6% de adolescentes entre 15 a 19 años están embarazadas o son madres y según INEI 2018, el parto (54.9%), enfermedades y complicaciones relacionadas al embarazo (9.5%) y aborto (6.8%), son causas de hospitalización.

Objetivo

Evidenciar si la adolescencia se comporta como factor de riesgo para complicaciones materno-fetales en gestantes atendidas en el Hospital de Ventanilla 2018.

Materiales y Métodos

Estudio cuantitativo, observacional, analítico, retrospectivo y transversal. Diseño de cohortes. Muestra de 119 gestantes adolescentes entre 12 a 17 años, comparado con 119 gestantes adultas entre 20 a 40 años, atendidas en el Hospital de Ventanilla de enero a diciembre del 2018. Selección aleatoria. Variables, embarazo adolescente y complicaciones materno-fetales. Técnica análisis documental de historias clínicas. Instrumento, hoja de recolección de datos. Se aplicó en SPSS V24, estadística descriptiva, riesgo relativo (RR), intervalo de confianza (IC) 95% y nivel de significancia del 5%.

Resultados

Atonía uterina: 3.4% adolescentes vs 1.7% adultas [RR=1.3; IC=0.7-2.4; p=0.480]. Restos placentarios: 5.9% adolescentes vs 2.5% adultas [RR=1.4; IC=0.9-2.1; p=0.196]. Episiotomía: 58.8% adolescentes vs 16% adultas [RR=2.3; IC=1.8-3.0; p=0.000]. Estado fetal no tranquilizador: 12.6% adolescentes vs 8.4% adultas [RR=1.2 IC=0.8-1.7; p=0.290]. Bajo peso al nacer: 7.6% adolescentes vs 0.8% adultas [RR=1.8; IC=1.4-2.3; p=0.010]. Apgar 0-3 al min: 4.2% adolescentes vs 1.7 adultas [RR=1.4; IC=0.8-2.3; p=0.250].

Conclusiones

2.3 veces más riesgo de episiotomía durante el parto en adolescentes en comparación con adultas y 1.8 veces más riesgo de bajo peso al nacer en bebés de madres adolescentes en comparación con bebés de madres adultas.

Palabras clave

Embarazo adolescente, riesgo, complicaciones del embarazo

