

MIEDO AL COVID-19 EN GESTANTES DURANTE SU PREINMUNIZACIÓN Y POSTINMUNIZACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2, EN EL PUESTO DE SALUD CARQUÍN, 2021

FEAR OF COVID-19 IN PREGNANT AND POST-IMMUNIZATION AGAINST SARS-COV-2, AT THE CARQUÍN HEALTH POST, 2021

Paolo Neil Valladares Bazalar ^a, Stephany Mirella Carrillo Ortiz ^a

a. Bachiller en Obstetricia



Introducción

Estudios evidencian una alta prevalencia de trastornos psicológicos durante la gestación. Según el análisis y revisión sistémica de 40 estudios en 17 países realizados por The Lancet Global Health durante el 2020-2021, existe un aumento de la depresión materna, ruptura de embarazos ectópicos y muertes maternas-fetales. Como consecuencia de no acudir a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, por el temor al contagio del COVID-19.

Objetivo

Comparar el nivel de miedo al COVID-19 en las gestantes durante su preinmunización y postinmunización contra el SARS-CoV-2, en el Puesto de Salud de Carquín, 2021.

Materiales y Métodos

Diseño no experimental, descriptivo - comparativo; de tipo observacional, prospectivo, longitudinal descriptivo y de nivel descriptivo. Población de 60 gestantes atendidas en el Puesto de Salud de Carquín en el 2021 y una muestra de 54 gestantes. Criterios de inclusión: gestantes sin diagnóstico de COVID-19. Criterios de exclusión: gestantes con diagnóstico de COVID-19. Se empleó la técnica de la encuesta mediante la herramienta "Escala de Miedo al COVID-19 versión peruana". Durante la intervención se brindó una orientación respecto al consentimiento informado y sus derechos a la privacidad de la información. Los datos recolectados, fueron ingresados y procesados en SPSS Statistics v.26. Posteriormente, fueron analizados mediante las tablas de frecuencia y la prueba de Chi Cuadrado, dando un nivel de significancia mayor a 0,08.

Resultados

Durante el período preinmunización, el 62,96% (n=3) presentó alto miedo, el 5,56% (n=17) tuvo bajo miedo y el 31,5% (n=34) transcurrió con regular miedo. Mientras que en el período postinmunización, el 11,1% (n=6) presentó alto miedo, el 9,3% (n=5) regular miedo y el 79,6% (n=43) bajo miedo.

Conclusiones

Existe una disminución significativa del nivel de miedo al COVID-19 en las gestantes, durante la postinmunización al SARS-CoV-2 en comparación al período preinmunización.

Palabras clave

Miedo, COVID-19, SARS-CoV-2, gestación, inmunización

