

TENDENCIA DE PRÁCTICAS PREVENTIVAS DEL CÁNCER CERVICOUTERINO SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, 2013 AL 2020

TRENDS IN PREVENTIVE PRACTICES OF CERVICAL CANCER ACCORDING TO RESIDENCE AREA OF WOMEN OF FERTILE AGE, 2013 TO 2020

Jhonny Jesus Chafloque Chavesta ^a, Alexandra Liñan Bermudez ^a, Pamela Leon Pastuso ^a



a. Obstetra



Introducción

El examen de Papanicolaou es un método de tamizaje, cuya realización y recojo de resultados, permiten la prevención, detección y tratamiento oportuno de lesiones del cuello uterino, las cuales mediante una evolución lenta y progresiva pueden llegar a convertirse en cáncer de cuello uterino.

Objetivo

Describir la tendencia de prácticas preventivas del cáncer cervicouterino según área de residencia de mujeres en edad fértil, 2013 al 2020.

Materiales y Métodos

Estudio observacional y retrospectivo de análisis de fuentes secundarias, basado en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del 2013 al 2020, en el que se evaluó a mujeres de 15 a 49 años. Las variables de estudio fueron el tamizaje de Papanicolaou y el recojo de resultados. En el análisis se utilizó estratificaciones, ponderados y gráficas de líneas de tendencia.

Resultados

El mayor porcentaje de mujeres que se realizaron el Papanicolaou fue de 85,2% (IC 83,7%-86,5%; CV 0,009) en el año 2017. Respecto al recojo de los resultados de Papanicolaou, el mayor porcentaje fue el 83,4% (IC 81,4%-85,3%; CV 0,012) en el año 2020. El recuento ponderado de mujeres que se realizaron este tamizaje, se incrementó de un 61,6% (57,8%- 65,2%; CV 0,03) a un 64,5% (62,9%-66%; CV 0,012) durante el periodo de estudio, mientras en el área rural, se redujo de 16,5% (14%-19,4%; CV 0,082) a 16% (15,1%-17%; CV 0,029) (Gráfico N°1). En tanto, el recojo de resultados aumentó de 63,9% (59,3%-68,3%; CV 0,036) al 69,9% (67,3%-72,5%; CV 0,019) en el área urbana y hubo una reducción de 14,3% (11,6%-17,5%; CV 0,104) a 13,5% (11,9%-15,3%; CV 0,065) en el área rural.

Conclusiones

Las prácticas preventivas del cáncer cervicouterino, como la toma de Papanicolaou y el recojo de resultados, han mantenido porcentajes similares durante el periodo de estudio, en zona rural y zona urbana.

Palabras clave

Cuello del útero, Prueba de papanicolaou, Neoplasias del cuello uterino, Área urbana, Área rural

