

COMPLICACIONES MATERNAS EN EL PARTO Y PUERPERIO EN PACIENTES CON CESÁREA PREVIA, ATENDIDAS EN UN HOSPITAL NIVEL III CUSCO - 2018

MATERNAL COMPLICATIONS IN LABOR AND PUERPERIUM IN PATIENTS WITH A PREVIOUS CESAREAN SECTION, ATTENDED AT A LEVEL III HOSPITAL CUSCO - 2018

Briyithee Milagros Vera Castillo ^a, Susan Arias Mendoza ^a, Luisa Mirtha Estrada Chiroque ^{a,b,c}

- a. Obstetra
- b. Magíster en Salud Pública
- c. Especialista en Emergencias Obstétricas y Alto Riesgo Obstétrico



Introducción

El manejo de gestantes con cesárea anterior siempre es un tema de debate, sobre todo por los riesgos y complicaciones que conlleva una intervención quirúrgica iterativa, el manejo en intentar un parto vaginal después de cesárea es recomendable y conveniente, sin embargo, es importante estar atentos a las complicaciones.

Objetivo

Determinar las complicaciones maternas en el parto y puerperio en pacientes con cesárea anterior, atendidas en el Hospital Antonio Lorena Cusco 2018.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo, transversal, con enfoque cuantitativo, retrospectivo, la muestra fue de 372 gestantes donde 186 tuvieron cesárea anterior y 186 no, entre enero a diciembre del 2018, siendo la técnica de revisión documental de historias clínicas en una ficha de recolección de datos validada por expertos, los datos fueron digitalizados en SPSS versión 23 para el análisis de datos.

Resultados

Las gestantes con cesárea anterior tuvieron edades entre 18-34 años en 60% y las que no tuvieron cesárea anterior tuvieron de 35 años a más en 46%, son multigestas 46% y 57% respectivamente; con periodo intergenésico de 2-5 años 68% y 73%, culminó en parto vaginal en 55% y 77%; en las que fueron cesárea el diagnóstico fue trastorno hipertensivo 19% y hemorragia en la segunda mitad del embarazo 15%. Las complicaciones maternas en el parto fueron distocias de la contractilidad 19% en gestantes con cesárea anterior y 22% en gestantes sin cesárea anterior, presentaron hemorragia intraparto 19% y 12%; en el puerperio se halló anemia por pérdidas 25% y 17%, hemorragia posparto 17% y 12%.

Conclusiones

Las características maternas y las de la cesárea previa influyen en la probabilidad de tener un parto vaginal ulterior y se evidencia que las complicaciones no difieren por el antecedente de cesárea, lo que amerita considerar la elección del parto vaginal en gestantes con cesárea anterior.

Palabras clave

Complicaciones, cesárea previa, parto, puerperio

