

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE GESTANTES COVID POSITIVO - HOSPITAL MARINO MOLINA SCIPPA 2020 - 2021

CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PREGNANT COVID POSITIVE - MARINO MOLINA SCIPPA 2020 - 2021

Ruth Amalia León Jacobo ¹ Karina Johana Sánchez Vidal²

¹ Obstetra, Magíster en Obstetricia con mención en Salud Sexual y Reproductiva. Hospital EsSalud Marino Molina Scippa, Lima, Perú

² Licenciada en Obstetricia. Consultorio Córdova E.I.R.L., Lima, Perú



Introducción. La pandemia del COVID-19 colapsó el sistema de salud, consideró a las gestantes como grupo vulnerable e impacto negativamente en el acceso a los servicios de salud específicamente en la atención prenatal.

Objetivo. Determinar el perfil clínico-epidemiológico de gestantes con infección por COVID-19 atendidas en el Hospital Marino Molina Scippa entre el 2020 y 2021.

Materiales y Métodos. Estudio descriptivo, retrospectivo y transversal en 298 gestantes con prueba serológica, antígeno o PCR positiva, atendidas en el Servicio de Ginecoobstetricia entre el 2020 y 2021. Se revisaron historias clínicas, libro de nacimientos y fichas epidemiológicas para recolectar variables sociodemográficas, obstétricas, epidemiológicas, clínicas y del recién nacido. El análisis descriptivo se realizó en SPSS v. 25.

Resultados. El perfil de gestante fue mujer adulta (64,8%), con una media de 31 años, de instrucción secundaria (51,3%), conviviente (72,8%), ama de casa (52,3%), multigesta (35,9%) con $2,3 \pm 1,3$ gestaciones, no controlada (55,4%), sin comorbilidad (68,5%), el 51,5% tuvo parto eutócico y recién nacido (RN) con Apgar normal (91,4%). Los síntomas y signos más frecuentes fueron tos (11,9%), dolor de garganta (9,8%), fiebre (7,4%) exudado faríngeo (5,1%) y disnea (2,2%); el 97,3% cursó la enfermedad sin complicaciones. El 47,3% fue IgG reactivo y el 30,2% IgM reactivo, el 78,2% no sabía la persona de contacto, de las que sí, el 32,3% señaló al esposo y como lugar de transmisión su casa (81,4%) o trabajo (13,6%). En su mayoría, los RN no tuvieron resultado, de los que sí, el 75,6% fue IgG reactivo y 13,5% IgG IgM reactivo.

Conclusiones. El perfil de gestante fue adulta, multigesta, no controlada, sin comorbilidad y cursó la enfermedad sin complicaciones, el 47,3% se diagnosticó en etapa tardía (IgG reactivo), la persona de contacto fue el esposo y el lugar de transmisión su casa.

Palabras clave: Infección por coronavirus, embarazo, signos y síntomas

Correspondencia: Ruth Amalia León Jacobo - Teléfono: (051) 933842719 - Email: ruthleon_01@yahoo.es

